



Le groupement des Agriculteurs BIO du Gers

Semis de cultures après couverts hivernaux

- **Agriculteur :** Philippe Couzinet à Bazian (parcelle à Riguepeu)
- **Type de sol :** argilo-limoneux superficiel
- **Topographie et exposition :** pente forte, exposition sud
- **Convictions de l'agriculteur :** intérêt des protéagineux
- **Objectif de l'itinéraire testé:** prairie base graminées qui tend à se détériorer, je cherche à gagner en productivité en première coupe et en qualité avec l'association de protéagineux
- **Précédent :**



Avec le soutien financier de :




LE COUVERT

- **Espèce(s) de couverts semée(s) :** féverole + avoine + triticale + pois + vesce
- **Mode d'implantation du couvert :** semoir sulky Unidrill dans une prairie



- **Date de semis du couvert + dose + profondeur :** le 1^{er} novembre 2013 (trop tard pour l'année)
Doses : respectivement 110 + 60 + 10 + 50 + 10 à 3cm de profondeur
- **Développement du couvert :**
Développement : pas mal, mais hétérogène suivant les zones de la parcelle



➤ **Récolte du couvert :**

Foin jeune au 8 juin 2014 (essai); la parcelle sans méteil a fait 3 fois moins de production que celle qui a été semée.

Fauche pour alimentation bétail (une grande partie de la féverole est restée en refus des vaches dans le nourrisseur)

LA CULTURE SUIVANTE

➤ **Culture(s) suivante(s) :** prairie déjà en place

➤ **Développement :** une zone de la parcelle n'a pas été semée en couvert.

A voir par la suite si différence de développement de la prairie entre la partie avec et la partie sans couvert. A voir cette année mais pour le moment pas de différence significative

➤ **Rendement :** 4.5 à 5t /Ha

➤ **Commentaires / Observations de l'agriculteur :**

Oui satisfait, du rendement, de la qualité même s'il y a eu des refus. La climato ne m'a pas permis de récolter en enrubannage comme c'était prévu : une expérience sur un foin a été faite ; il ne fait pas de féverole pour mettre du méteil en foin !!